

# Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)

## le Céphale

### Statut

RE

CR

EN

VU

NT

LC

Bourgogne  
Franche-Comté

DD

NA

NE

Europe – LC  
France – LC

Le statut du Céphale n'est pas préoccupant actuellement, même s'il est moins répandu qu'autrefois.

Denis JUCAN



Mâle (Haute-Saône, 2009).

### Écologie et biologie

Le Céphale est un Fadet mésophile préférant le calcaire, les bois clairs, les ourlets, les biotopes bien exposés mais toujours pourvus d'une importante strate arbustive. Il longe les buissons et s'y pose le plus souvent. Les chenilles consomment les feuilles de diverses Poacées (Méliques, Brachypodes, Fétuques...), comme celles de tous les Satyrines.

### Description et risques de confusion

Il n'existe que peu de risques de confusion avec les autres Fadets, même si la littérature mentionne quelques cas d'hybridation avec le Mélitée (*Coenonympha hero*). *C. arcania* se pose toujours les ailes relevées, et l'on reconnaît alors la large bande postmédiane blanche caractéristique des ailes postérieures, flanquée d'une série d'ocelles, dont trois nettement plus grands.

Le Céphale pourrait être confondu avec le Fadet de la Mélique, mais chez celui-ci, la bande blanche est moins importante ; en outre, ce dernier paraît plus sombre et terne en vol.

### Distribution

*C. arcania* est une espèce holoméditerranéenne, en régression modérée dans une bonne partie de la France. Elle est présente partout en Franche-Comté sauf en zone montagneuse ; en Bourgogne, elle est rare hors des zones calcaires accidentées : elle manque particulièrement en plaine de Saône (Bresse), dans le Brionnais, le Charolais, le Bazois et la Puisaye. Elle reste très localisée et en faible densité dans les placettes bien exposées du Morvan et de l'Autunois.

### Phénologie

Espèce univoltine, volant essentiellement de la fin mai à la fin juin, avec des individus tardifs possibles en juillet. Dans les environs de Dijon et de Vesoul, quelques rares individus appartenant à une deuxième génération partielle sont parfois observés en fin d'été (cycle rapide et émergence précoce).

Dates extrêmes : 8 mai – 16 août (puis, très rarement, 25 août ; 1<sup>er</sup> octobre ; 16 octobre !).

### Atteintes et menaces

Le Céphale requiert une strate arbustive importante, notamment en lisières. La gestion forestière en futaie régulière lui est préjudiciable.

Cette espèce ne semble pas menacée, mais ses densités sont bien moins importantes que par le passé ; elle évite de nombreuses zones, notamment en plaine. Son cas illustre parfaitement l'intérêt de conserver des massifs de buissons sur les pâturages où les fauches d'entretien sont de plus en plus régulières et conduisent à l'élimination systématique de toute strate arbustive.

### Orientations de gestion et mesures conservatoires


Les principales mesures reposent sur la conservation de forêts anciennes claires, de lisières ensoleillées et de haies hautes.

Dans les systèmes pâturés, notamment les pelouses sèches, le maintien de bouquets de buissons bien contenus s'avère très favorable, permettant au passage à de nombreux autres papillons de prospérer.

### Difficulté de détermination



### Diagramme écologique



Lucile FLUPAK



Mâle (Yonne, 2009).

Claude VOINOT



Pariade, femelle à gauche (Côte-d'Or, 2009).

Jean-François MARADAN




Femelle (Doubs, 2009).


Claude VOINOT



Accouplement, femelle à gauche (Côte-d'Or, 2005).



Phénologie de *Coenonympha arcania*.



Distribution de *Coenonympha arcania* en Bourgogne et Franche-Comté.